

Verein

.....
.....
.....
.....

Landesverwaltungsamt
Referat Naturschutz, Land-
schaftspflege
Dessauer Str. 70

06118 H a l l e /Saale

....., den

Antrag auf Ausnahmegenehmigung für die Durchführung von Vergrämungsabschüssen von Kormoranen auf folgenden Gewässern

.....
.....

Wegen erhöhten Bestandes an Kormoranen verbunden
Mit entsprechender Gefährdung des Fischbestandes
beantragen wir hiermit eine Ausnahmegenehmigung für
die Durchführung von Vergrämungsabschüssen im o.g.
Bereich.

.....
Stempel / Unterschrift

Teichwirtschaften und Fließgewässer im Land Sachsen-Anhalt für die aufgrund ihrer besonderen Empfindlichkeit/Gefährdung Abwehrmaßnahmen gegen Kormorane zugelassen werden können

Gewässer	Abgrenzung	Begründung für Vergrämgungsmaßnahmen
Aga	Gesamter Verlauf im LSA	Gefährdete Fischarten der Forellenregion.
Aller	Schwanefeld bis Seggerde	Gemäß Erlass MLU vom 18.08.06; Vorkommen Elritze u. Quappe.
Bode	Vom Harz (einschließlich Zuflüsse im Harz) bis Staßfurt	Gefährdete Fischarten der Forellen-, Äschen- und Barbenregion, insbesondere Äsche, Barbe und Quappe.
Dumme	Oberhalb Salzwedel	Gefährdete Fischarten der Forellenregion, im Unterlauf auch Steinbeißer und Bitterling.
Helme	Gesamter Verlauf im LSA einschließlich einmündenden Salmonidenbächen	Gefährdete Fischarten der Forellen-, Äschen- und Barbenregion, insbesondere Äsche und Barbe.
Holtemme	Wernigerode bis Mündung	Gefährdete Fischarten der Forellen- und Äschenregion, insbesondere Äsche sowie im Unterlauf auch Barbe.
Ihle	Hohenziatz bis Mündung	Gefährdete Fischarten der Forellenregion.
Ilse	Ilsenburg bis Landesgrenze	Gefährdete Fischarten der Forellenregion, potenzielles Lachslaichgewässer.
Milde-Biese	Gardelegen bis Seehausen	Oberlauf: Fischarten der Forellenregion, Mittellauf: Steinbeißer, Quappe.
Mulde	Oberhalb Muldestausee	Gefährdete Fischarten der Barbenregion, insbesondere Barbe, Zährte.
Nuthe	Gesamter Verlauf außerhalb Biosphärenreservat	Gefährdete Fischarten der Forellen- und Äschenregion, insbes. Äsche sowie Quappe und Steinbeißer. Potenzielles Laichgebiet für Meerforellen und Flussneunaugen.
Rosslau	Gesamter Verlauf oberhalb Rosslau	Gefährdete Fischarten der Forellenregion sowie Äsche und Quappe, potenzielles Laichgebiet für Meerforellen und Flussneunaugen.
Saale	Oberhalb Merseburg bis Landesgrenze	Gefährdete Fischarten der Barbenregion, insbesondere Barbe u. Zährte. Bedeutendster Zährtenbestand Deutschlands.
Schwarze Elster	Außerhalb NSG	Barbenvorkommen. Potenzielles Laichgewässer für Flussneunaugen.
Selke	Gesamter Verlauf außerhalb NSG	Gefährdete Fischarten der Forellen-, Äschen- und Barbenregion.
Unstrut	Gesamter Verlauf im LSA	Barben- und Zährtenvorkommen.
Weißer Elster	Südlicher Abschnitt im LSA	Barbenvorkommen.
Wipper	Gesamter Verlauf im LSA	Gefährdete Fischarten der Forellen- und Äschenregion.

Anmerkung: Nach Angaben des Landesanglerverbandes S/A ist auch der Fischbestand der **Ohre** unterhalb des Drömlings stark vom Kormoranbeflug betroffen. Der Fluss weist hier jedoch keine Bereiche mehr auf, die der Forellen-, Äschen- oder Barbenregion zugeordnet werden können. Schützenswert ist jedoch die Binnenquappenpopulation. Darüber hinaus ist der Fluss ein potenzielles Laichgewässer für Flussneunaugen. Fangnachweise für diese Art stehen aber noch aus. Eine Kormoranabwehr außerhalb der bestehenden NSG sollte abgewogen werden.